

PLAN DE MODERNIZACION, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD

Costa

Mogán
LIVE THE **sun**LIGHT



ANEXO III. CATÁLOGO FLORÍSTICO

CATÁLOGO DE ESPECIES PARA AJARDINAMIENTO Y REVEGETACIÓN

Las especies seleccionadas se consideran de las más adecuadas para llevar a cabo los procesos de revegetación y ajardinamiento del ámbito de actuación. La **revegetación** consiste restaurar la cubierta vegetal de una zona de acuerdo a las formaciones preexistentes al momento de su degradación, por lo que se llevará a cabo en las áreas naturales o colindantes a las mismas. Por su parte, el **ajardinamiento** sería el proceso mediante el cual se prepara un terreno para ser vegetado y que pueda reconvertirse como un elemento de disfrute, utilizándose de manera prioritaria en las zonas más antropizadas y en los intersticios urbanos.

Se plantea la utilización de distintas especies atendiendo a: las características intrínsecas de las áreas susceptibles de acoger este tipo de actuación (grado de naturalidad o antropización, probabilidad de dispersión de especies alóctonas, etc.), al objetivo de intervención (creación de un espacio de disfrute, integración paisajística y/o restitución de las condiciones ambientales) y la capacidad de adaptación de las especies a las condiciones ambientales. De acuerdo a lo anterior, se pueden diferenciar tres ámbitos: franja litoral, espacio urbano o interior y área de transición.

1. **Franja litoral:** Espacio colindante a la línea de costa, afectada directamente por el spray salino y con una fuerte componente xérica.
2. **Espacio urbano o interior:** Zona altamente antropizada, donde la vegetación aparece asociada esencialmente a los espacios libres, ajardinamientos, viales y rotondas.
3. **Área de transición:** Áreas de contacto entre el espacio urbano y el natural o naturalizado. Son espacios emplazados esencialmente en laderas y proximidades de cauces de barrancos y que precisan esencialmente de una restauración ecológica.

En el catálogo elaborado se identifican las especies prioritarias, nominadas con el nombre científico y el vernáculo, definiéndose: el **porte** (tapizante, arbustivo y/o arbóreo), del que se deriva la capacidad para dar sombra o para influir sobre calidad escénica; la **adaptabilidad**, en correspondencia con las condiciones ambientales del medio; el **mantenimiento**, relacionado con la necesidad de cuidados culturales que precisan las distintas especies; y el **origen** de la misma (autóctona o alóctona), que repercutirá principalmente sobre la restricción de establecer especies exóticas en espacios naturales o sus proximidades. Así mismo, ninguna se encuentra registrada en el *Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras*, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo del *Real Decreto 630/2013*, de 2 de agosto.

A modo de resumen, se puede especificar que las actuaciones de revegetación y ajardinamiento se emplearán: magarza, guaydil taginaste blanco, siempreviva, palmera canaria, etc. en la franja

costera; mimosa, acalifa, acacia de Constantinopla, bouganvilla, casia, flamboyán, drago, cardón, etc., en el espacio urbanizado; y tabaiba dulce, verode, tarajal y balo, en las zonas de transición.

VEGETACIÓN PRIORITARIA PARA LAS LABORES DE AJARDINAMIENTO Y REVEGETACIÓN POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

ESPECIES A EMPLEAR EN LA FRANJA LITORAL (espacios libres, paseos marítimos, etc.)

Araucaria heterophylla (**Araucaria**)

Porte: arbórea

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Argyranthemum frutescens (**Magarza**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Casuarina equisetifolia (**Casuarina**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Convolvulus floridus (**Guaydil**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: moderado

Origen: autóctona



Echium decaisnei (**Taginaste blanco**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Limonium sventenii (**Siempreviva**)

Porte: tapizante-subarbusivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Lotus maculatus (**Pico de cernícalo**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona (endémismo de Tenerife)



Phoenix canariensis (**Palmera canaria**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Coccoloba uvifera (**Uva de Mar**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Hibiscus rosa-sinensis (**Hibiscos**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Westringia fruticosa (**Romero costero**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Aparte de las anteriores, se pueden emplear una gran variedad de especies de **cactus y plantas crasas** como: *Adenium*, *A. angustifolia*, *A. attenuata*, *A. franzosini*, *Aloe vera*, *Cereus peruvianus*, *Echeveria elegans*, *E. imbricata*, *E. laui*, *Echinocactus grusonii*, *E. platycanthus*, *Euphorbia keysii*, *E. mili*, *Ferocactus glaucescens*, *F. hystrix*, *F. pilosus*, *Sansevieria cylindrica*, *S. thyrsiflora* y *S. trifasciata*.

ESPECIES A EMPLEAR EN EL ESPACIO URBANO O INTERIOR (espacios libres, jardines, etc.)

A parte de: los cactus y plantas grasas, la margarza (*Argyranthemum frutescens*), el guaydil (*Convolvulus floridus*), el taginaste blanco (*Echium decaisnei*), la siempreviva (*Limonium sventenii*), la palmera canaria (*Phoenix canariensis*) y la uva de mar (*Coccoloba uvifera*) -vistas todas para la franja litoral-; y la tabaiba dulce (*Euphorbia balsamifera*), el verode (*Kleinia neriifolia*), el balo (*Plocama pendula*) y el tarajal (*Tamarix*

canariensis) -propuestas para las áreas de transición-, se proponen las siguientes especies:

Acacia cyanophylla (**Mimosa de hoja azul**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Acacia dealbata (**Mimosa**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Acalypha wilkesiana (**Acalifa**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Aesculus hippocastanum (**Castaño de Indias**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Albizia julibrissin (**Acacia de Constantinopla**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Aptenia cordifolia (**Rocío**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Archontophoenix alexandrae (**Palma de Alexandro**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Archontophoenix cunninghamiana (**Palma Rey**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Bauhinia variegata (**Árbol de las orquídeas**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Bismarckia nobilis (**Bismarckia**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Bougainvillea spectabilis (**Bougainvilla**)

Porte: tapizante-trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Brachychiton acerifolius (**Árbol de fuego**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Brachychiton populneus (**Brachychiton**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Butia capitata (**Palmera de la jalea**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Caesalpinia pulcherrima (**Orgullo de Barbados**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Carpobrotus acinaciformis (**Flor de cuchillo**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Cassia didymobotrya (**Casia o Flor de Gofio**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Ceiba pentandra (**Ceiba**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Celtis australis (**Almez**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Cerastium tomentosum (**Cerastio**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Cercis siliquastrum (**Árbol del amor**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Chorisia speciosa (**Palo borracho**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Cistus albidus (**Jara blanca**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Cistus monspeliensis (**Jaguarzo**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Cotoneaster lacteus (**Griñolera lechosa**)

Porte: tapizante-arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Especies pertenecientes a la familia de **Cycadacea**: *Cycas aculeata*, *C. angulata*, *C. badnesis*, *C. cairnsiana*, *C. debaoensis*, *C. edentata*, *C. falcata*, *C. hainanensis*, *C. lanepolei*, *C. maconochiei*, *C. pachypoda*, *C. revoluta*, etc.

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona

<i>Delonix regia</i> (Flamboyán) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Delosperma cooperi</i> (Delosperma) <u>Porte</u>: tapizante <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Dichondra repens</i> (Oreja de ratón) <u>Porte</u>: tapizante <u>Adaptabilidad</u>: moderada <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Disphyma crassifolium</i> (Cabellera de la reina) <u>Porte</u>: tapizante <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	

Dorotheanthus bellidiformis (**Margatrita de Livingstone**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Dracaena draco (**Drago**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Drosanthemum floribundum (**Drosantemo**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Dypsis decaryi (**Palmera triangular**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Euphorbia canariensis (**Cardón**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Eleagnus angustifolia (**Árbol del Paraíso**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Ficus benjamina (**Ficus benjamina**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Ficus elástica (**Ficus de hoja grande**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: moderado-alto

Origen: alóctona



Ficus macrophylla (**Ficus australiano**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Ficus microcarpa (**Laurel de Indias**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Ficus repens (**Higuera trepadora**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Frankenia laevis (**Brezo de mar**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Hedera canariensis (**Hiedra canaria**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: autóctona



Hyophorbe lagenicaulis (**Palma botella**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Hyophorbe verschaffeltii (**Palma fusiforme**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Hypericum calycinum (**Rosa de San Juan**)

Porte: arbustivo-tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Jacaranda mimosifolia (**Jacaranda**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado-alto

Origen: alóctona



Jasminum nudiflorum (**Jazmín amarillo**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona




Jasminum mesnyi (**Jazmín amarillo**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Juniperus turbinata (**Sabina**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Kleinia mandraliscae (**Bálsamo azul**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Lantana camara (**Bandera Española**)

Porte: tapizante-arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Latania verschoffeltii (**Latania amarilla**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Lathyrus latifolius (**La Albejana**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Lavandula canariensis (**Matorrisco común**)

Porte: tapizante-arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Lavandula minutolii (**Lavanda**)

Porte: tapizante-arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Lippia repens (**Lipia**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Livistona chinensis (**Palmera de abanico**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Livistona decipiens (**Palma llorona**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Lonicera japonica (**Madreselva**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona




Lotus berthelotii (**Pico de paloma**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona (endémismo de Tenerife)



Malvaviscos arboreus (**Malvavisco**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Morus alba (**Morera**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Micromeria varia (**Tomillo**)

Porte: tapizante-arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Olea europaea spp. guanchica (**Acebuche**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: moderada

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Pandanus utilis (**Pándano**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Parthenocissus tricuspidata (**Parra virgen**)

Porte: trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Pistacia atlantica (**Almácigo**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Pistacia lentiscus (**Lentisco**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Platanus acerifolia (**Plátano de sombra**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Plumbago auriculata (**Embeleso o Celestina**)

Porte: tapizante-trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: moderado

Origen: alóctona



Pritchardia pacifica (**Palma de Fiji**)

Porte: arbustivo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



<i>Prunus dulcis</i> (Almendro) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Ptychosperma elegans</i> (Palma solitaria) <u>Porte</u>: arbustiva <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Rosa banksiae</i> (Rosal de Banksia) <u>Porte</u>: tapizante-trpadora <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Rosmarinus officinalis</i> (Romero) <u>Porte</u>: tapizante-arbustivo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	

Roystonea oleracea (**Palmera imperial**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Roystonea regia (**Palmera real**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Rubia fruticosa (**Tasaigo**)

Porte: tapizante-trepadora

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



Salvia microphylla (**Salvia rosa**)

Porte: tapizante

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Schinus molle (**Falso pimentero**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: baja

Origen: alóctona



Spathodea campanulata (**Tulipero de Gabón**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: baja

Origen: alóctona



<i>Tecomaria capensis</i> (Bignonia roja) <u>Porte</u>: arbustivo-trepador <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Tecoma stans</i> (Bignonia amarilla) <u>Porte</u>: arbustivo-arboreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Teucrium fruticans</i> (Olivilla blanca) <u>Porte</u>: arbustivo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Tipuana tipu</i> (Tipa) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	

<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Jazmín estrella) <u>Porte</u>: trepadora <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Veitchia joannis</i> (Palmera Joannis) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Vinca major</i> (Hierba doncella) <u>Porte</u>: trepadora <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	
<i>Vitis coignetiae</i> (Viña ornamental) <u>Porte</u>: trepadora <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: moderado <u>Origen</u>: alóctona	

Wodyetia bifurcata (**Palma cola de zorro**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona



Especies pertenecientes a la familia de Zamiaceae: *Dioon angustifolium*, *D. argenteum*, *D. califanoi*, *D. caputoi*, *D. edule*, etc.; *Bowenia serrulata*, *B. spectabilis*; *Macozamia cardiacensis*, *M. communis*, *M. denisoni*, *M. fraseri*, etc.; *Lepidozamia hopei*, *L. peroffskyana*; *Encephartos aemulans*, *E. altensteinii*, *E. brevifoliolatus*, *E. caffer*, *E. delucanus*, *E. equatorialis*, etc.; *Ceratozamia alvarezii*, *C. becerrae*, *C. hildae*, *C. mexicana*, etc.; *Zamia acuminata*, *Z. amblyphyllidia*, *Z. angustifolia*, etc.

Porte: tapizante, subarborescente

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: alóctona

ESPECIES A EMPLEAR EN EL ÁREA DE TRANSICIÓN (laderas, cauces de barranco, etc.)

Euphorbia balsamifera (**Tabaiba dulce**)

Porte: arbóreo

Adaptabilidad: alta

Mantenimiento: bajo

Origen: autóctona



<i>Kleinia neriifolia</i> (Verode) <u>Porte</u>: arbustivo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: autóctona	
<i>Plocama pendula</i> (Balo) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: autóctona	
<i>Tamarix canariensis</i> (Tarajal) <u>Porte</u>: arbóreo <u>Adaptabilidad</u>: alta <u>Mantenimiento</u>: bajo <u>Origen</u>: autóctona	

TABLA RESUMEN DE ESPECIES PARA ESPACIOS LIBRES

ESPECIES				UTILIZACIÓN EN ESPACIOS LIBRES		
Origen	Estrato	Nombre científico	Nombre común	Franja costera	Urbanos	Laderas
ESPECIES DE FLORA AUTÓCTONA	Tapizantes y trepadoras	<i>Argyranthemum frutescens</i>	Magarza	X	X	X
		<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo	X	X	
		<i>Hedera canariensis</i>	Hiedra canaria		X	
		<i>Limonium sventenii</i>	Siempre viva	X	X	X
		<i>Rubia fruticosa</i>	Tasaigo	X	X	X



ESPECIES DE FLORA ALÓCTONA	Arbustivas y subarbustivas	<i>Aeonium arboreum</i>	Siempreviva arbórea	X	X	X
		<i>Aeonium manriqueorum</i>	Bejeque	X	X	X
		<i>Aeonium percarneum</i>	Aeonium	X	X	X
		<i>Aeonium simsii</i>	Aeonium	X	X	X
		<i>Ceropegia fusca</i>	Cardoncillo gris	X	X	X
		<i>Convolvulus floridus</i>	Guaydil	X	X	X
		<i>Echium decaisnei</i>	Taginaste blanco	X	X	X
		<i>Euphorbia canariensis</i>	Cardón	X	X	X
		<i>Euphorbia balsamifera</i>	Tabaiba dulce	X	X	X
		<i>Kleinia neriifolia</i>	Verode	X	X	X
		<i>Lavandula canariensis</i>	Matorrisco común	X	X	X
		<i>Lavandula minutolii</i>	Lavanda	X	X	X
		<i>Rumex lunaria</i>	Vinagrera		X	X
		<i>Senecio kleinia</i>	Verode	X	X	X
	Árboreas y arborescentes	<i>Dracaena draco</i>	Drago	X	X	X
		<i>Juniperus turbinata</i>	Sabina	X	X	
		<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria	X	X	
		<i>Plocama pendula</i>	Balo	X	X	X
		<i>Tamarix canariensis</i>	Tarajal	X	X	X
		<i>Micromeria varia</i>	Tomillo	X	X	
		<i>Olea europaea spp. guanchica</i>	Acebuche		X	
		<i>Pistacia atlantica</i>	Almácigo		X	
		<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco		X	
	Tapizantes y trepadoras	<i>Aptenia cordifolia</i>	Rocío		X	
		<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	Flor de cuchillo	X	X	
		<i>Cephalocereus senilis</i>	Cabeza de viejo	X	X	
		<i>Cerastium tomentosum</i>	Cerastio	X	X	
		<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	X	X	
		<i>Cotoneaster lacteus</i>	Griñolera lechosa	X	X	
		<i>Delosperma cooperi</i>	Delosperma	X	X	
		<i>Dichondra repens</i>	Oreja de ratón		X	
		<i>Disphyma crassifolium</i>	Cabellera de la reina	X	X	
		<i>Dorotheanthus bellidiformis</i>	Margatrita de livingstone	X	X	
		<i>Drosanthemum floribundum</i>	Drosantemo		X	
		<i>Ficus repens</i>	Higuera trepadora		X	
		<i>Frankenia laevis</i>	Brezo de mar	X	X	
		<i>Hypericum calycinum</i>	Rosa de San Juan		X	
		<i>Jasminum nudiflorum</i>	Jazmín amarillo	X	X	
		<i>Jasminum mesnyi</i>	Jazmín amarillo	X	X	
		<i>Kleinia mandraliscae</i>	Bálsamo azul	X	X	
		<i>Lantana montevidensis</i>	Lantana rastrera	X	X	
		<i>Lathyrus latifolius</i>	Albejana	X	X	



Arbustivas y subarbustivas	<i>Lippia repens</i>	Lipia		X	
	<i>Lonicera japonica</i>	Madreselva		X	
	<i>Lotus maculatus</i> (end. Tf)	Livingstone	X	X	
	<i>Lotus berthelotii</i> (end. Tf)	Pico de paloma		X	
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Parra virgen		X	
	<i>Paspalum vaginatum</i>	Césped del mar	X	X	
	<i>Pelargonium peltatum</i>	Geranio hiedra		X	
	<i>Pilosocereus polygonus</i>	Cactus	X	X	
	<i>Rosa banksiae</i>	Rosal de Banksia	X	X	
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	X	X	
	<i>Salvia microphylla</i>	Salvia rosa	X	X	
	<i>Tecomaria capensis</i>	Bignonia roja	X	X	
	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	Jazmín estrella		X	
	<i>Vinca major</i>	Hierba doncella		X	
	<i>Vitis coignetiae</i>	Viña ornamental		X	
	<i>Acalypha wilkesiana</i>	Acalifa		X	
	<i>Adenium ssp.</i>	Adenium		X	
	<i>Agave angustifolia</i>	Espadín	X	X	
	<i>Agave attenuata</i>	Ágave atenuado	X	X	
	<i>Agave franzosini</i>	Ágave	X	X	
	<i>Aloe vera</i>	Sábila	X	X	
	<i>Bougainvillea glabra</i>	Flor de papel	X	X	
	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bouganvilla	X	X	
	<i>Bowenia ssp.</i>	Bowenia		X	
	<i>Cassia didymobotrya</i>	Casia		X	
	<i>Ceretozamia ssp.</i>	Ceretozamia		X	
	<i>Cereus giganteus</i>	Cactus gigante	X	X	
	<i>Cereus peruvianus</i>	Cereus	X	X	
	<i>Cycas ssp.</i>	Cycas	X	X	
	<i>Dioon ssp.</i>	Dioon	X	X	
	<i>Echeveria elegans</i>	Echeveria	X	X	
	<i>Echeveria imbricata</i>	Echeveria	X	X	
	<i>Echeveria laui</i>	Echeveria	X	X	
	<i>Echinocactus grusonii</i>	Asiento de suegra	X	X	
	<i>Echinocactus platycanthus</i>	Biznaga	X	X	
	<i>Encephalartos ssp.</i>	Encephalartos		X	
	<i>Euphorbia candelabrum</i>	Candelabro	X	X	
	<i>Euphorbia keysii</i>	Espina de Cristo	X	X	
	<i>Euphorbia milii</i>	Corona de Cristo	X	X	
	<i>Ferocactus glaucescens</i>	Ferocactus	X	X	
	<i>Ferocactus hystrix</i>	Ferocactus hystrix	X	X	
	<i>Ferocactus pilosus</i>	Ferocactus	X	X	

Arbóreas y arborecentes	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Hibisco		X	
	<i>Lantana camara</i>	Bandera Española	X	X	
	<i>Latania verschaaffeltii</i>	Latania amarilla	X	X	
	<i>Lepidozamia ssp.</i>	Lepidozamia		X	
	<i>Macrozamia ssp.</i>	Macrozamia		X	
	<i>Malvaviscos arboreus</i>	Malvavisco	X	X	
	<i>Megakepasma erythrochlamys</i>	Justicia roja	X	X	
	<i>Nandina domestica</i>	Nandina	X	X	
	<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	X	X	
	<i>Plumbago auriculata</i>	Embeleso	X	X	
	<i>Sansevieria cylindrica</i>	Lanza africana	X	X	
	<i>Sansevieria thyrsiflora</i>	Cola de tigre	X	X	
	<i>Sansevieria trifasciata</i>	Sansevieria	X	X	
	<i>Schefflera actinophylla</i>	Árbol paraguas		X	
	<i>Schefflera arboricola</i>	Cheflera		X	
	<i>Ravenala madagascariensis</i>	Palma del viajero	X	X	
	<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla blanca	X	X	
	<i>Thevetia peruviana</i>	Adelfa amarilla	X	X	
	<i>Westringia fruticosa</i>	Romero costero	X	X	
	<i>Zamia ssp.</i>	Zamia		X	
	<i>Acacia cyanophylla</i>	Mimosa de hoja azul	X	X	
	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa		X	
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Castano de Indias		X	
	<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de Constantinopla		X	
	<i>Araucaria heterophylla</i>	Araucaria		X	
	<i>Archontophoenix alexandrae</i>	Palma de Alexandro	X	X	
	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	Palma Rey	X	X	
	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas		X	
	<i>Bismarckia nobilis</i>	Bismarckia	X	X	
	<i>Brachychiton acerifolius</i>	Árbol de fuego		X	
	<i>Brachychiton populneus</i>	Brachychiton		X	
	<i>Brahea armata</i>	Palmera azul mexicana			
	<i>Butia capitata</i>	Palmera de la jalea	X	X	
	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Orgullo de Barbados		X	
	<i>Cassia spectabilis</i>	Mucuteno		X	
	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	X	X	
	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba	X	X	
	<i>Celtis australis</i>	Almez		X	
	<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo		X	
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Árbol del amor		X	
	<i>Chorisia speciosa</i>	Palo borracho		X	
	<i>Coccoloba uvifera</i>	Uva de playa	X	X	



	<i>Cocos nucifera</i>	Cocotero	X	X	
	<i>Cordyline australis</i>	Drácena	X	X	
	<i>Delonix regia</i>	Flamboyán	X	X	
	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmera triangular	X	X	
	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Árbol del Paraíso	X	X	
	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus benjamina	X	X	
	<i>Ficus elástica</i>	Ficus de hoja grande		X	
	<i>Ficus macrophylla</i>	Ficus australiano		X	
	<i>Ficus microcarpa</i>	Laurel de Indias		X	
	<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>	Palma botella	X	X	
	<i>Hyophorbe verschaffeltii</i>	Palma fusiforme	X	X	
	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda		X	
	<i>Livistona chinensis</i>	Palmera de abanico	X	X	
	<i>Livistona decipiens</i>	Palma llorona	X	X	
	<i>Macadamia tetraphylla</i>	Nuez de macadamia		X	
	<i>Magnifera indica</i>	Mango		X	
	<i>Markhamia lutea</i>	Tulipero del Nilo		X	
	<i>Morus alba</i>	Morera		X	
	<i>Pandanus utilis</i>	Pándano	X	X	
	<i>Persea americana</i>	Aguacatero		X	
	<i>Platanus acerifolia</i>	Plátano de sombra		X	
	<i>Pritchardia pacifica</i>	Palma de Fiji	X	X	
	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro		X	
	<i>Ptychosperma elegans</i>	Palma solitaria	X	X	
	<i>Roystonea oleracea</i>	Palmera imperial	X	X	
	<i>Roystonea regia</i>	Palmera real	X	X	
	<i>Schinus molle</i>	Falso pimentero		X	
	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Turbito		X	
	<i>Spathodea campanulata</i>	Tulipero de Gabón		X	
	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarindo		X	
	<i>Tecoma stans</i>	Bignonia amarilla		X	
	<i>Terminalia catappa</i>	Falso Kamani		X	
	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa		X	
	<i>Veitchia joannis</i>	Palmera Joannis	X	X	
	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Palma cola de zorro	X	X	